

INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU

Wzmoczone zasady bioasekuracji w związku z sezonową migracją dzikich ptaków

W związku z rozpoczęciem sezonu jesienno-zimowego oraz nasileniem migracji dzikich ptaków, wzrasta ryzyko wprowadzenia wirusów grypy ptaków (HPAI) do zakładów utrzymujących drób oraz miejsc, w których utrzymywane są ptaki w niewoli na potrzeby własne.

Dzikie ptaki, zwłaszcza gatunki związane ze środowiskiem wodnym, stanowią naturalny rezerwuár wirusów grypy ptaków i przyczyniają się do ich rozprzestrzeniania. Dlatego w okresie zwiększonego ryzyka szczególnego znaczenia nabiera podejmowanie działań prewencyjnych mających na celu zmniejszenie prawdopodobieństwa wprowadzenia i rozprzestrzeniania się zakażenia, ochronę zdrowia utrzymywanego drobiu oraz ograniczenie strat związanych z wystąpieniem choroby.

1. Wzmocnienie bioasekuracji w gospodarstwach przydomowych:

Hodowcy drobiu powinni zwrócić szczególną uwagę na:

✓ przestrzeganie wymagań bioasekuracyjnych:

- utrzymywania drobiu w sposób ograniczający kontakt z dzikim ptactwem, w tym szczególnie należy wykluczyć dostęp do zbiorników wodnych, do których mają dostęp dzikie ptaki,
- przechowywania paszy i ściółki w sposób, który zabezpiecza przed kontaktem z dzikimi ptakami i ich odchodami, gryzoniami, zwierzętami domowymi i dzikimi,
- przestrzeganie zakazu pojenia drobiu wodą ze zbiorników, w tym z wód powierzchniowych, do których mają dostęp dzikie ptaki,
- obsługi stada: przestrzeganie higieny osobistej osób mających kontakt z ptakami, w szczególności mycie i odkażanie rąk, stosowanie odzieży i obuwia ochronnego do użytku tylko w pomieszczeniu/wolierze, w których utrzymywany jest drób; oczyszczanie i odkażanie obuwia, oczyszczanie i odkażanie stosowanych sprzętów i narzędzi.

2. Zminimalizowanie ryzyka związanego z zakupem ptaków do małych hodowli przyzagrodowych:

Szczególną uwagę należy zwrócić na miejsce pochodzenia kupowanych ptaków i ich status zdrowotny.


Nie należy nabywać ptaków z nielegalnych, nieobjętych nadzorem punktów sprzedaży, w szczególności z przypadkowych miejsc zlokalizowanych na obrzeżach targowisk, parkingach, stacjach paliw lub innych miejscach, w których nie można potwierdzić pochodzenia i statusu zdrowotnego zwierząt. Zakup ptaków z nieznanego źródła może stanowić istotne zagrożenie epizootyczne i prowadzić do wprowadzenia choroby do gospodarstwa i jej szerokiego rozprzestrzeniania się w związku z przemieszczaniem drobiu w ramach niekontrolowanego obrotu.

W związku z powyższym zaleca się nabywanie ptaków wyłącznie ze źródeł, które zapewniają możliwość potwierdzenia ich pochodzenia i spełnienia obowiązujących wymagań weterynaryjnych.

3. Wzmocnienie monitoringu dzikich ptaków

Należy zwracać szczególną uwagę na padłe lub chore dzikie ptaki, zwłaszcza ptaki wodne, które mogą przenosić wirusy grypy ptaków. Znalezienie padłego dzikiego ptaka należy zgłosić do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Bartoszycach, ul. Bema 33, tel. 89 7642471 w godzinach pracy urzędu: pon.- pt. 7.00-15.00., śr.: 7.00-18.00. Po ocenie przydatności, pobierzemy próby do badań laboratoryjnych.

Szybkie wykrycie zakażenia u dzikich ptaków jest bardzo ważne, ponieważ pozwala na podjęcie odpowiednich działań i ograniczenie ryzyka rozprzestrzeniania się choroby.



4. Obserwacja stada i niezwłoczne zgłaszanie niepokojących objawów

Każdy hodowca powinien na bieżąco obserwować stan zdrowotny utrzymywanego drobiu.

Szczególną uwagę należy zwrócić na:

- nagłe zwiększenie liczby padnięć;
- wyraźny spadek pobierania paszy lub wody;
- spadek nieśności;
- pojawienie się objawów chorobowych lub nietypowych zmian w zachowaniu ptaków.

W przypadku wystąpienia niepokojących objawów należy niezwłocznie skontaktować się z Powiatowym Inspektorem Weterynarii w Bartoszychach.

Powyższe zasady pozostają kluczowym elementem ochrony gospodarstwa przed wprowadzeniem wirusa.